

### 1. バイアスピリン錠100mg



【白い錠剤でBA100】

朝	昼	夕	寝
1			

1日 1回  
朝食後  
にお飲みください

<< 分包しています >>

#### ● 効能効果

血小板凝集を抑制して、血栓ができるのを予防します。

#### ● 副作用

ほとんど、副作用のない薬ですが、出血、下痢(1%以下)などが起こります。

#### ● 注意事項

抜歯、手術をする予定のある方は医師にお知らせください。

### 2. メンテート錠2.5mg



【白い錠剤でTA201】

朝	昼	夕	寝
1			

1日 1回  
朝食後  
にお飲みください

<< 分包しています >>

#### ● 効能効果

この薬は心臓の自律神経に作用します。心臓の負担を減らして、心不全、狭心症、高血圧、不整脈などに使われます。

#### ● 副作用

徐脈、倦怠感、息切れ、むくみ、呼吸困難等の症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

#### ● 注意事項

めまい、ふらつきを起こすことがありますので、危険を伴う日常動作には十分注意してください。

### 3. アムロジピンOD錠5.0mg「EMEC」



【ルパスクの後発品:EE 211】

朝	昼	夕	寝
1			

1日 1回  
朝食後  
にお飲みください

<< 分包しています >>

#### ● 効能効果

この薬は血管を広げる薬で、心臓の負担を減らす作用と血圧を整える作用があります。

#### ● 副作用

服用中、悪心・嘔吐、全身倦怠感、脱力感、褐色尿、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、脈が遅くなる、青あざができやすい、発熱、のどが痛いなどの症状が現れたときは、すぐに医師にお知らせください。

#### ● 注意事項

めまい、ふらつきを起こすことがありますので、危険を伴う日常動作には十分注意してください。

この薬を飲んでいる間はグレープフルーツを食べたりグレープフルーツジュースを飲むと、血圧が下がり過ぎてフラフラしたり、胸がドキドキしたりすることがあるので、控えるようにして下さい。

### 4. ニコランジル錠 5mg「サワイ」



【シグマの後発品:SW722】

朝	昼	夕	寝
1	1	1	

1日 3回  
朝昼夕食後  
にお飲みください

<< 分包しています >>

#### ● 効能効果

血管を広げる薬で、心臓の負担を減らす作用があります。

#### ● 副作用

頭痛(4%)、などが起こります。

### 5. クラビット錠500mg



【うすい橙色の錠剤でDSC731】

朝	昼	夕	寝
1			

1日 1回  
朝食後  
にお飲みください

<< 分包しています >>

#### ● 効能効果

ニューキノロン系経口抗菌製剤で、感染時に細菌などのDNA複製を阻害し、殺菌作用を示します。

#### ● 副作用

主な副作用として、めまい、吐き気、不眠などが報告されています。

#### ● 注意事項

この薬により、意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作をする際には十分注意するようにしてください。